



TAMIZ AUDITIVO

SOLICÍTALO CUANDO NAZCA TU BEBÉ

Escuchar es fundamental para adquirir y desarrollar el lenguaje oral. Si un chiquitín tiene pérdida auditiva (hipoacusia) ya sea moderada, severa o profunda, sus posibilidades de hablar estarán limitadas o serán prácticamente nulas.



¿Qué es el tamiz auditivo neonatal?

El Tamiz Auditivo Neonatal es una prueba sencilla y rápida, que permite detectar disminución de la audición o sordera en recién nacidos. En México no siempre se realiza, por lo que es muy importante que lo solicites y te cerciores de que sea efectuado.



¿Por qué es tan importante el tamiz auditivo neonatal?

Si se detectan anomalías en los primeros tres meses de vida, existen métodos que pueden evitar las limitaciones en el desarrollo integral del niño, principalmente en el lenguaje y el aprendizaje, como la correcta adaptación de auxiliares auditivos.

¿Cómo se realiza?

Se coloca un pequeño "audífono" en el oído del bebé. La prueba dura unos segundos y registra la capacidad auditiva del bebé. La prueba no causa dolor y el resultado se entrega de inmediato.



¿A quién se realiza y en que momento?

1. Se debe de realizar a todos los bebés recién nacidos y hasta los 3 meses.
- 2.- Existe un mayor riesgo de algún grado de pérdida auditiva en los bebés con factores de riesgo como:

- Antecedentes familiares de sordera.
- Cualquier malformación en cara o cuello.
- Sufrimiento fetal.
- Nacimiento antes de término.
- Producto de embarazo de alto riesgo.
- Peso bajo al nacer (menos de 1500 g).
- Necesidad de permanencia en incubadora durante más de 24 horas.
- Baja oxigenación o asfisia neonatal.
- Permanencia en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales durante más de 24 horas.
- Administración de medicamentos que dañan el oído.
- Enfermedades maternas como rubéola, citomegalovirus, herpes o toxoplasmosis.

La sordera representa uno de los principales problemas al nacimiento y de discapacidad en la población infantil.

¿Qué pasa si sale alterado?

Se tiene que repetir el estudio, preferentemente antes de los 3 meses de edad.

¡CONSULTA A TU PEDIATRA!

